

DT·Matrix

temp



Chaque capsule contient

Betterave	110mg
(racine, <i>Beta vulgaris</i>) extrait 10:1 équivalent à 1100 mg de racine sèche	
Artichaut	110mg
(feuille, <i>Cynara scolymus</i>) extrait 10:1 équivalent à 1100 mg de feuille sèche	
Chardon-marie	110mg
(graines, <i>Silybum marianum</i>) extrait 30:1 équivalent à 3300 mg de graines sèches, normalisé à 80% de silymarine	
Bardane	100mg
(racine, <i>Articum lappa</i>) extrait 4:1 équivalent à 400 mg de racine sèche	
Ortie dioïque	100mg
(racine, <i>Urtica dioica</i>) extrait 4:1 équivalent à 400 mg de racine sèche	
Busserole	60mg
(feuille, <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>) extrait 4:1 équivalent à 240 mg de feuille sèche	
Picrorhiza	50mg
(racine, <i>Picrorhiza kurro</i>) extrait 10:1 équivalent à 500 mg de racine sèche, normalisé à 5% de kutkine	

Ingrédients non médicinaux

Cellulose microcristalline, hypromellose, stéarate de magnésium.

Indications

Bardane utilisé traditionnellement en phytothérapie comme altératif pour aider à éliminer les toxines par le biais des reins, de la peau et des muqueuses. Utilisé en phytothérapie pour aider à soulager les malaises digestifs et à réduire la difficulté à uriner associée aux premiers stades de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).

Mode d'emploi

Adultes (18 ans et plus) - Prendre 1 capsule, 3 fois par jour. Prendre quelques heures avant ou après la prise d'autres médicaments ou produits de santé naturels. Pour usage occasionnel seulement. Consulter un professionnel de soins de santé pour un usage de plus 1 semaine.

Mises en garde et avertissements

Ne pas utiliser si • vous êtes enceinte • vous êtes allaitante • vous avez une obstruction des voies biliaires • vous êtes allergique aux plantes de la famille des Astéracées/Composées/Marguerite • vous souffrez de maladie du cœur • vous souffrez d'hyper- ou d'hypotension • vous souffrez d'un trouble du foie ou des reins • vous souffrez de diabète • vous souffrez d'œdème • vous prenez des produits contenant un diurétique. Consulter un professionnel de soins de santé avant d'en faire l'usage si • vous avez des calculs biliaires • vous avez le diabète • vous avez une intolérance au glucose • vous prenez des diurétiques. Cesser l'usage et

obtenir une attention médicale immédiatement en cas d'étourdissements, de confusion, de faiblesses ou de douleurs musculaires, de battements du cœur irréguliers et/ou de difficulté à respirer. Consulter un professionnel de soins de santé si les symptômes persistent ou s'aggravent. En cas d'hypersensibilité (par ex., une allergie), cesser l'utilisation. Garder hors de la portée des enfants.

Rangement

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.