

Multi-Strain 50

Sans gluten

Sans Fructooligosaccharides (FOS)



Chaque capsule contient

<i>Bifidobacterium longum</i> subsp. <i>longum</i> (HA-135)	11 milliards UFC
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> B (HA-111)	9 milliards UFC
<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (HA-119)	7,5 milliards UFC
<i>Lactobacillus helveticus</i> (HA-122)	6,5 milliards UFC
<i>Lactobacillus paracasei</i> (HA-108)	6,5 milliards UFC
<i>Ligilactobacillus salivarius</i> (HA-118)	6,5 milliards UFC
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (HA-132)	1 milliard UFC
<i>Bifidobacterium breve</i> (HA-129)	1 milliard UFC
<i>Bifidobacterium longum</i> subsp. <i>infantis</i> (HA-116)	1 milliard UFC

Ingrédients non médicaux

Acide ascorbique, acides gras d'huile de palmiste, bouillon trypticase soja (soya), extrait de levure, fécule de pomme de terre, gomme de gellane, hypromellose, lait écrémé (lait), sucres (sucrose).

Indications

Source de probiotiques. Contribue à soutenir la santé gastrointestinale.

Mode d'emploi

Adultes (18 ans et plus) - Prendre 1 capsule par jour. Prendre au moins 2 à 3 heures avant ou après la prise d'antibiotiques.

Mises en garde et avertissements

Allergènes: lait, soya. Ne pas utiliser si • vous souffrez d'un déficit immunitaire (p. ex., sida • lymphome • patients subissant un traitement prolongé aux corticostéroïdes) • vous souffrez d'allergie aux produits laitiers ou au soya. Ce produit est entré en contact avec le lait et le soya. Consulter un professionnel de soins de santé avant d'en faire l'usage si vous souffrez • de fièvre • de vomissements • de diarrhée sanglante • de graves douleurs abdominales. Cesser l'utilisation et consulter un professionnel de soins de santé si • des symptômes de troubles digestifs tels que diarrhée apparaissent, s'aggravent et/ou persistent au-delà de 3 jours. Garder hors de la portée des enfants.

Rangement

Garder au réfrigérateur. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.