

Mood•Matrix


Convient aux végétaliens

Sans OGM

Sans gluten

Sans soya

Sans produits laitiers



Chaque capsule contient

L-5-HTP (graine, <i>Griffonia simplicifolia</i>)	100mg
GABA (4-acide aminobutyrique)	33,3mg
Magnésium (Malate de di-magnésium d'Albion, chélate de bisglycinate de magnésium Albion)*	25mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate)	25mg
Safr'Inside(mc) Safran (stigmat, <i>Crocus sativus</i>) extrait 5:1 équivalent à 50mg stigmat sèche**	10mg
Zinc (chélate de bisglycinate de zinc Albion)*	8mg
Folate (L-5 méthyltétrahydrofolate)	100mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine)	33,3mcg



*Albion™ and the Albion Gold Medallion design are trademarks of Balchem Corporation or its subsidiaries.

safr'inside. ** Safr'Inside™ is a trademark of ACTIV'INSIDE.

Ingrédients non médicinaux

Acide citrique, cellulose microcristalline, farine de riz brun, glycine, hypromellose, maltodextrine, silice, stéarate de magnésium.

Indications

Aide à favoriser un équilibre sain de l'humeur. Aide à promouvoir temporairement un état de relaxation. Peut aider à soulager les symptômes de la fibromyalgie. Aide au métabolisme de l'énergie et à la formation des tissus.

Mode d'emploi

Adultes (19 ans et plus) - Prendre 1 capsule, 3 fois par jour avec un repas. Consulter un professionnel de soins de santé pour un usage de plus de 1 ans. Pour la prophylaxie de la migraine, utiliser pendant au moins 2 à 3 semaines afin de constater des effets bénéfiques. Pour l'équilibre de l'humeur, utiliser pendant au moins 1 semaine afin de constater des effets bénéfiques. Pour le soulagement des symptômes de la fibromyalgie, utiliser pendant au moins 2 à 3 semaines afin de constater des effets bénéfiques.

Mises en garde et avertissements

Ne pas utiliser si • vous êtes enceinte • vous êtes allaitante • vous souffrez de sclérodémie • vous prenez des anticoagulants • vous prenez des antiagrégants • vous prenez des plaquettaires • vous souffrez d'un trouble hémostatique. Consulter un professionnel de la santé avant utilisation si vous prenez de la carbidopa ou des médicaments ou suppléments sérotoninergiques. Ceux-ci incluent, mais ne se limitent pas à • L-tryptophane • S-Adénosylméthionine (SAME) • Millepertuis officinal • antidépresseurs • antidouleurs • médicaments en vente libre pour le rhume et la grippe qui contiennent du dextrométhorphan • médicaments antinausée • antimigraux. Consulter un professionnel de la santé si vous souffrez d'une affection psychologique telle que • l'anxiété • la dépression. Cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé si • vous souffrez de faiblesse • d'ulcères oraux • de douleurs abdominales accompagnées de douleurs musculaires sévères • de changements au niveau de la peau. Certaines personnes pourraient avoir • la diarrhée • le nausées • le vomissements • les douleurs abdominales • somnolence. Éviter de prendre avec de l'alcool ou des produits qui causent de la somnolence. Faire preuve de prudence lors du maniement de machinerie lourde, pendant la conduite d'un véhicule automobile ou dans le cadre d'activités exigeant la vivacité d'esprit. Consulter un

professionnel de soins de santé si les symptômes persistent ou s'aggravent. Garder hors de la portée des enfants.

Durée d'utilisation

Consulter un professionnel de soins de santé pour un usage de plus de 1 ans. Pour la prophylaxie de la migraine, utiliser pendant au moins 2 à 3 semaines afin de constater des effets bénéfiques. Pour l'équilibre de l'humeur, utiliser pendant au moins 1 semaine afin de constater des effets bénéfiques. Pour le soulagement des symptômes de la fibromyalgie, utiliser pendant au moins 2 à 3 semaines afin de constater des effets bénéfiques.

Contre-indications

Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitante, ou si vous souffrez de sclérodémie. Ne pas utiliser si vous prenez des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires ou si vous souffrez d'un trouble hémostatique.

Réactions indésirables connues

Certaines personnes pourraient avoir la diarrhée, le nausées, le vomissements et les douleurs abdominales. Ce produit peut provoquer de la somnolence. Faire preuve de prudence lors du maniement de machinerie lourde, pendant la conduite d'un véhicule automobile ou dans le cadre d'activités exigeant la vivacité d'esprit.

Rangement

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.