

Cyto·D3 2500UI - gouttes base TCM

Sans OGM

Sans gluten

Sans produits laitiers

UGS	Format	Forme
193244	90 Gélules	Gélules
193245	15 ml	Gouttes



Chaque goutte contient

Vitamine D3 2500UI (62,5mcg)
(cholécalférol)

Ingrédients non médicinaux

Triglycérides à chaîne moyenne de noix de coco, d-alpha-tocophérol.

Indications

Aide à prévenir une carence en vitamine D.

Mode d'emploi

Adultes - Prendre 1 goutte par jour avec un apport suffisant de calcium ou selon l'avis d'un professionnel de soins de santé.

Mises en garde et avertissements

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Consulter un professionnel de soins de santé avant d'en faire l'usage surtout si vous êtes enceinte ou allaitante, ou si vous souffrez d'un troubles des reins. Consulter un professionnel de soins de santé avant d'en faire l'usage si vous prenez tout médicament d'ordonnance, y inclus des antiacides, des anticonvulsivants, de la digoxine, de la cholestyramine, du colestipol, de l'huile minérale, des stéroïdes, des statines ou des diurétiques thiazidiques, ou si vous prenez d'autres suppléments de vitamine D, des suppléments multivitaminiques contenant de la vitamine D ou des produits contenant des analogues de la vitamine D. Un apport de 15 à 20 mcg (600 à 800 UI) de vitamine D par jour est suffisant pour la plupart des personnes. Consulter un professionnel de soins de santé avant de prendre ce produit afin de déterminer si vous avez besoin d'un apport additionnel de vitamine D.

Durée d'utilisation

Consulter un professionnel de soins de santé pour un usage de plus de 6 mois.

Contre-indications

Ne pas utiliser ce produit si vous Soulever souffrez d'hypercalcémie ou d'hypercalciurie.

Réactions indésirables connues

Cesser l'usage et consulter un professionnel de soins de santé en cas de faiblesse, de fatigue, de somnolence, de maux de tête, de manque d'appétit, de sécheresse buccale, de goût métallique, de nausées, de vomissements, de vertiges, de bourdonnements dans les oreilles, de manque de coordination et de faiblesse musculaire, lesquels

sont des symptômes précoces d'hypercalcémie; ou si vous manifestez d'autres effets secondaires.

Rangement

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.