

Testosterone Matrix

Sans OGM

Sans gluten

Sans soya

Sans produits laitiers



Chaque capsule contient

Testofen ^{MD} Fenugrec	200mg
(graine, <i>Trigonella foenum-graecum</i>) extrait 33:1 équivalent à 6600mg de graine sèche, normalisé à 50% saponines	
KSM-66 ^{MD} Ashwagandha	200mg
(racine, <i>Withania somnifera</i>) 12:1 équivalent à 2400mg de racine sèche, normalisé à 5% withanolides	
Magnésium	16,66mg
(chélate de bisglycinate de magnésium Albion)	
Vitamine B6	10mg
(pyridoxal-5-phosphate)	
Zinc	5mg
(chélate de bisglycinate de zinc Albion)***	
Vitamine D	333,33UI / 8,33mcg
(cholécalférol)	

 *Testofen® is a registered trademark of Gencor.

 ** KSM-66 is a registered trademark of Ixoreal Biomed Inc.

***Mineral chelate supplied by Albion Laboratories,  Inc. Albion™ is a trademark of Balchem Corporation or its subsidiaries.

Ingrédients non médicinaux

Acide citrique, glycine, hypromellose, maltodextrine, stéarate de magnésium, silice.

Indications

Aide à favoriser la production de testostérone chez les hommes. Aide à soutenir les taux de testostérone libre chez les hommes. Aide à soutenir la libido (le désir sexuel) chez les hommes. Aide à réduire les symptômes du déficit androgénique lié à l'âge, à élever les taux de testostérone totale et libre (dans la plage normale) et à augmenter la libido, le désir et l'excitation chez les hommes adultes souffrant du déficit androgénique lié à l'âge. Aide à soutenir la libido et le désir sexuel sains des femmes. Aide à promouvoir la performance physique chez les personnes n'ayant aucun entraînement antérieur, lorsque combinée à un entraînement musculaire régulier.

Mode d'emploi

Adultes (19 ans et plus) - Prendre 3 capsules par jour avec un repas. Prendre quelques heures avant ou après la prise de médicaments ou produits de santé naturels. À favoriser la performance physique: utiliser pendant au moins 8 semaines afin de constater des effets bénéfiques. Consulter un professionnel de soins de santé pour un usage de plus de 12 semaines.

Mises en garde et avertissements

Ne pas utiliser ce produit si • vous avez déjà eu ou avez un cancer du sein ou des tumeurs aux seins • vous avez une prédisposition au cancer du sein, comme indiqué par une mammographie ou une biopsie anormale, ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein. Consulter un professionnel de la santé avant d'en faire l'usage • si vous êtes enceinte • allaitez • ou tentez de concevoir • si vous suivez une hormonothérapie de remplacement • si vous prenez des contraceptifs oraux • ou avez des antécédents de maladie hormonale ou gynécologique, incluant l'endométriose • ou des fibromes utérins. Consulter un professionnel de la santé si vous avez une repousse anormale de poils. Assurez-vous que votre dossier médical est à jour quant aux mammographies et aux évaluations gynécologiques avant de prendre ce produit et pendant son utilisation. Consulter un professionnel de la santé avant d'en faire l'usage • si vous avez une maladie de la thyroïde • le diabète • une hypertrophie bénigne de la prostate • le cancer de la prostate • ou si vous avez reçu un diagnostic de trouble de désir sexuel hypoactif • de dysfonction sexuelle • ou de dysérection • ou si vous souffrez de tout trouble ou problème psychologique comme l'anxiété ou la dépression à répétition. Cesser l'usage et consulter un professionnel de la santé si vous éprouvez • des douleurs • de l'inconfort • de la sensibilité aux seins • des douleurs articulaires • des bouffées congestives • un cycle menstruel irrégulier • des douleurs à la poitrine • des maux de tête • des étourdissements • un essoufflement • des saignements du nez • ou une vision trouble. Lorsque vous utilisez ce produit • la consommation de ce produit avec l'alcool, des médicaments ou d'autres produits de santé naturels ayant des effets sédatifs, est déconseillée • certaines personnes pourraient ressentir de la somnolence. Faire preuve de prudence si vous conduisez de la machinerie lourde ou tout autre véhicule motorisé,

ou si vous devez entreprendre des activités qui requièrent de la vigilance. Consulter un professionnel de la santé si • les symptômes persistent ou s'aggravent. Garder hors de la portée des enfants.